

Alivio Flash

Solución Oral

UN ALIVIO
EXTREMO
PARA DOLORES
EXTREMOS



ALIVIO
RÁPIDO
EN MOVIMIENTO



FÓRMULA

Cada sobre con 10 mL contiene:

Dexketoprofeno Trometamol 36,92 mg

(equivalente a Dexketoprofeno base 25,00 mg).

Excipientes c.s.p.

Forma farmacéutica: Solución oral.

Uso: Analgésico.



INDICACIONES

Alivio sintomático de dolores leves a moderados de diverso origen, tales como: dolor musculoesquelético, dolor dental, dolor de cabeza, dolor menstrual (dismenorrea) y dolor postraumático.



DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: Oral.

Adultos: Según prescripción médica. La dosis usual es de 1-2 sobres al día (25-50 mg), según la intensidad del dolor. No exceder 4 días de tratamiento sin consultar al médico.

Si los síntomas persisten o empeoran, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Use la dosis más baja efectiva durante el menor tiempo posible para el control de los síntomas.

Se recomienda precaución en pacientes con enfermedad renal, hepática o cardíaca, antecedentes de úlcera gastroduodenal, hemorragia gastrointestinal, asma o trastornos de la coagulación.

Puede causar somnolencia o mareos, por lo que podría afectar la capacidad para conducir u operar maquinaria.

Evite el consumo de alcohol durante el tratamiento.

Contiene sacarina sódica. Este medicamento no debe utilizarse con otros AINE o con medicamentos que contengan dexketoprofeno.

Consulte a su médico antes de usar si es adulto mayor, si está deshidratado o si padece otras enfermedades crónicas.



USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

No se debe administrar durante el embarazo, especialmente en el tercer trimestre, ni durante la lactancia, salvo indicación expresa del médico.



CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al dexketoprofeno, ácido acetilsalicílico, otros AINE o a cualquiera de los excipientes.

Antecedentes de asma, urticaria o reacciones alérgicas inducidas por AINE.

Úlcera péptica activa, hemorragia gastrointestinal, insuficiencia hepática, renal o cardíaca grave.

Trastornos de la coagulación.

No administrar en menores de 18 años.



INTERAICCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

Asociaciones no recomendadas: Ácido acetilsalicílico, corticosteroides, anticoagulantes (warfarina), heparina, litio, metotrexato, hidantoínas y fenitoína.

Asociaciones que requieren precaución: Inhibidores de la ECA, diuréticos, betabloqueantes, ciclosporina, tacrolimus, metotrexato, zidovudina, probenecid y sulfonilureas.

Asociaciones a tener en cuenta: ISRS, antidepresivos tricíclicos, antiagregantes plaquetarios, glucocorticoides y otros AINE, ya que pueden aumentar el riesgo de efectos adversos gastrointestinales y de sangrado.



REACCIONES ADVERSAS

Efectos adversos frecuentes: Náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, dispepsia.

Efectos adversos poco frecuentes: Mareos, somnolencia, cefalea, vértigo, trastornos del sueño, erupción cutánea, prurito, sudoración.

Efectos adversos raros: Úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, alteraciones de la función hepática o renal, reacciones alérgicas graves (anafilaxia), retención de líquidos, tensión arterial elevada.

Si presenta cualquier reacción adversa, suspenda el uso y consulte a su médico.



PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Caja con 12 sobres de 10 mL cada uno.

Vía de administración: Oral.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura menor de 30 °C.

No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Venta bajo receta médica.