

Mentolina

SUEÑO

TÉ INDUCTOR DEL SUEÑO

Mentol, Manzanilla y Melatonina.



FÓRMULA

Cada sobre (15 gramos) contiene:
Difenhidramina Clorhidrato 50,00 mg.
Excipientes: Melatonina, c.s.p.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución bebible.

USOS

Conciliación del sueño.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático en adultos del insomnio ocasional, particularmente cuando existe dificultad para conciliar el sueño, como en situaciones de intranquilidad o nerviosismo.

DOSIS

Adultos: Tomar 1 sobre con 1 taza con agua caliente, 30 minutos antes de acostarse. No exceder la dosis ni la frecuencia recomendada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un ambiente fresco y seco a temperatura no mayor a 30 °C.

INSTRUCCIONES

Vía de administración: oral. Venta sin receta médica. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a una temperatura menor a 30 °C.

LEYENDAS

Té inductor del sueño. SIN AZÚCAR.
COMBATE EL INSOMNIO.
PROMUEVE UN DESCANSO SALUDABLE.
AYUDA A ENFOCARTE DURANTE EL DÍA.
Mentol, Manzanilla y Melatonina.

PRECAUCIONES

Evite el manejo de automóvil o equipo pesado si está tomando este medicamento. Use con precaución con otros fármacos con propiedades antimuscarínicas (atropina, antidepresivos tricíclicos). En caso de sobredosis y/o intoxicación, consulte inmediatamente a su médico para utilizar las medidas de soporte.

ADVERTENCIAS

Evitar el uso en pacientes adultos mayores con confusión. Se puede desarrollar tolerancia con el uso continuo. No lo tome por más de 2 semanas sin consultar al médico. Busque atención médica si el insomnio persiste. El insomnio puede ser un síntoma de una condición médica subyacente.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del medicamento. No emplear este producto en caso de glaucoma, asma, enfisema, enfermedad pulmonar crónica, problemas respiratorios y dificultad de orinar debido a la dilatación de la glándula prostática. No administrar durante el embarazo o cuando se sospeche de su existencia, ni en el tercer trimestre del embarazo o durante el periodo de lactancia. No administrar en menores de 18 años.

REACCIONES ADVERSAS

Podrían ocurrir algunas reacciones adversas como las siguientes: fatiga, sedación, somnolencia, trastornos de la atención, inestabilidad, mareo, boca seca, taquicardia, visión borrosa, cefaleas. Desórdenes gastrointestinales incluyendo náusea y vómito, espasmos musculares, dificultad para orinar.

INTERACCIONES

No combinar con alcohol y otros depresores del sistema nervioso central (tranquilizantes, hipnóticos y ansiolíticos) ya que aumentan el efecto sedativo de este medicamento. Los inhibidores de la Monoaminoxidasa (MAO) prolongan e intensifican los efectos anticolinérgicos de los antihistamínicos.

REGISTRO SANITARIO

Honduras: HN-M-1224-0002
Nicaragua: RMNHN-M-1224-0002

Infarma

Un mejor mañana
comienza con un buen descanso

Dulces sueños,
días más productivos